



**Killgerm**<sup>®</sup>  
www.killgerm.com

**sakarot® DWAX BAIT**

**Zawiera 0,05g/kg (0,005%) difenakum**

**Sakarot D Wax Bait** jest gotowym preparatem do zwalczania myszy i szczurów wewnątrz oraz wokół budynków. Wyłącznie do użytku przez profesjonalistów.

**SPOSÓB UŻYCIA:** Umieścić Sakarot D Wax w miejscach występowania gryzoni. Produkt może być wykorzystywany w różnych warunkach oraz rozmieszczany na różne sposoby. Zawsze priorytetowe znaczenie powinno mieć ograniczenie narażenia niezwalczanych gatunków na działanie preparatu. Metodami rozmieszczenia rodentycydu przez profesjonalnych użytkowników jest umieszczenie go w zamkniętych stacjach deratyzacyjnych (zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich), punktach deratyzacyjnych (przewidywanych rozmieszczeniach, zabezpieczonych przed dostępem do przynęty gatunków niedocelowych przy pomocy materiałów lub środowiska naturalnego), zastosowanie trutki bez zabezpieczenia lecz w miejscach niedostępnych dla innych gatunków niż zwalczane. Trutkę można umieścić w stacjach, które mogą być przymocowane do podłoża. W przypadku wykładania trutki bezpośrednio do nory gryzoni, należy wykorzystać odpowiednie tacki lub naturalne elementy (kamienie, kawałki drewna), nanieść na nie preparat, umieścić w norze a następnie przykryć otwór kępką trawy lub innym naturalnym materiałem. Produkt powinien być używany z rozwagą. Śmierć gryzoni następuje po ok. 4-10 dniach od spożycia dawki śmiertelnej (dwa lub więcej pobran).

**ZWROTY OKREŚLAJĄCE ZAGROŻENIE**

Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Może powodować uszkodzenie narażeń wewnątrz ciała poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.

**ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku narażenia lub styknięcia: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIŁ z lekarzem. Przechowywać w zamkniętym pojemniku.



**NIEBEZPIECZYSTWO**

**DAWKOWANIE PREPARATU**

**Miejsce zastosowania:** Gospodarstwa domowe, obiekty komercyjne, rolnictwo.

**Zalecana częstotliwość kontroli miejsc wyłożenia preparatu:** Często przez pierwsze 10 dni, następnie regularnie do czasu ustania poboru preparatu.

**Myszy** Umieścić 2-5 cm (2-5g) preparatu w każdym punkcie, odstępy pomiędzy punktami 2-5 m.

**Szczury** umieścić 4-8 pasków o długości 15 cm i średnicy 1cm. 50-100g preparatu na punkt, odstępy pomiędzy punktami 1-10m.

Do aplikacji wymagany jest pistolet dozujący (stosowany np. do tuby z klejem lub uszczelnaczem). Przytrzymać tubę z preparatem i odciąć końcówkę plastikowej kopuły nad gwintem, ostrożnie by nie uszkodzić gwintu ani się nie skaleczyć. Następnie dołączyć (nakreślając) do tuby plastikową końcówkę dozującą. Umieścić w pistolecie dozującym i rozpocząć aplikację preparatu w odpowiednich miejscach, zgodnie z opisem powyżej. Dla ułatwienia dozowania odcinek 5 cm jest równy średnicy tuby w której znajduje się preparat. Podczas korzystania z pistoletu dozującego końcówkę każdą pojedynczą aplikację preparatu poprzez zwolnienie spustu pistoletu dozującego, zarzysowanie końcówką o stałą, by zapobiec wyciekom preparatu, oraz nalożyć nakreślę na nasadkę końcówki dozującej. Przechowywać w chłodnym miejscu. Używać szpatułki do usuwania preparatu ze stacji podczas czyszczenia. Zakładając rękawice ochronne zarówno na czas procesu aplikacji jak i czyszczenia/usuwanie rodentycydu z pistoletu czy szpatułki. Regularnie Kontynuować wyłożony preparat i zastępować go nowym w razie potrzeby (podanie lub zanieczyszczenie rodentycydu). Działanie kontynuować do czasu ustania poboru preparatu, zazwyczaj po 1-3 tygodniach. Przez pierwsze dziesięć dni często kontrolować wyłożony preparat, następnie regularnie aż do czasu zaobserwowania braku ułowy rodentycydu. Wyszukiwanie i usuwanie dła martwych gryzoni powinno odbywać się nie rzadziej niż inspekcje punktów kontrolnych. W niektórych przypadkach może zaistnieć potrzeba codziennych inspekcji. Przy wyborze środków gryzoniobójczych należy ocenić czy populacja gryzoni może posiadać odporność na określone preparaty. Jeżeli istnieje takie podejrzenie odnośnie do kontrolowanego obszaru, należy zrezygnować z takiego produktu. W celu powstrzymania rozprzestrzenienia się odporności, zalecane jest stosowanie produktów zawierających różne substancje czynne. Nie należy korzystać z trutek w postaci rodentycydu opartych na antykoagulantach w ramach długotrwałego programu kontroli gryzoni, chyba że odbywa się

pełną kontrolą pracownika firmy bez kontroli lub innej kompetentnej osoby. W większości sytuacji zastosowanie rodentycydu antykoagulantów powinno rozwiązać problem w ciągu 35 dni. Jeżeli aktywność gryzoni jest nadal zauważalna, należy ustalić możliwe przyczyny.

Trzymać z dala od artykułów spożywczych, napojów oraz karmy dla zwierząt. Wszystkie stacje z trutką należy oznakować dobrze widoczną etykietą: trującą. Wyzyskiwanie martwych osobników i pozostałości trutki powinno odbywać się regularnie zarówno w trakcie jak i po zakończeniu akcji kontrolnej. Usuwać w sposób bezpieczny.

Chronić przed dostępem dzieci, zwierząt domowych (w szczególności kotów, psów i świnek). Szkodliwie dla środowiska naturalnego. Nie dopuścić do zanieczyszczenia produktem gleby, wód powierzchniowych i kanalizacji. Biocydy należy stosować w sposób bezpieczny, zrównoważony i przemyślany. Stosowanie niniejszego produktu w celach innych niż podane w etykiecie jest niezgodne z prawem. Produkt NIE do sprzedaży ani użytku dla nieprofesjonalistów. Użyć szpatułki lub oczyszczalnicę preparatu. Po aplikacji/przed posiłkiem umyć ręce i skórę narażoną na działanie preparatu.

**Nr pozwolenia: PL/2014/0152/MR**

**STOSOWANIE W MIEJSCACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ** W przypadku aplikacji preparatu do stacji deratyzacyjnych, powinny być one wyraźnie oznakowane informacją o zawartości (trutka na szczury) oraz ostrzeżenie przed kontaktem (NIE dotykać). Gdy preparat jest aplikowany w miejscach użyteczności publicznej, należy podczas trwania zabiegu oznaczyć jego obszar oraz w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc wyłożenia preparatu umieścić informacje o ryzyku bezpośredniego i wtórnego zatrucia antykoagulantem oraz środków pierwszej pomocy w razie zatrucia.

**PRZECHOWYWANIE I UTYLIZACJA** Przechowywać szczelnie zamknięte w oryginalnym pojemniku, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Z dala od produktów o silnym zapachu oraz utleniaczy. Okres trwałości do 2 lat. Nie wykorzystywać powtórnie opróżnionego pojemnika. Umieszczenie preparatu na dłuższy okres w warunkach, które mogą przyczynić się do obniżenia jego atrakcyjności (poprzez wysuszenie czy zakurzenie). Unikać stosowania produktu w pobliżu rur z gorącą wodą, kotłowni i miejsc o temperaturze >30°C. W celu ułatwienia aplikacji preparatu z tub, które były przechowywane w niskiej temperaturze (<10°C), umieścić opakowania na 1/2 h w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej (zimą 10-18°C, latem 15-20°C).

Podczas ciepłych miesięcy przechowywać i transportować produkt w sposób zabezpieczający go przed działaniem wysokich temperatur. Produkt do użytku w letnich miesiącach oznaczony jest czerwona naklejka z nr serii. Produkt do użytku w zimowych miesiącach oznaczony jest białą naklejką z nr serii. W celu zapobieżenia przypadkowemu spożyciu przez człowieka Sakarot D Wax zawiera Bitrex<sup>®</sup>. Usunąć wszystkie wyłożone trutki po zakończeniu zabiegu zwalczania gryzoni, zgodnie z obowiązującymi lokalnymi/krajowymi prawem. Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych. Martwe gryzoni należy utylizować zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami.

**INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA I UŻYTKOWANIA** Nie przelewać produktu do innych pojemników. Niezbędna jest dokładna inspekcja miejsca występowania szkodników, zwłaszcza miejsc zacisznych i oświetlonych, w celu określenia wielkości infestacji. Głaba martwych gryzoni jak również niewykorzystana oraz znajdujących się poza pierwotnym miejscem wyłożenia trutki powinny być zbierane podczas wszystkich kontroli, w celu zmniejszenia ryzyka zatrucia dzieci, zwierząt domowych i innych zwierząt niż docelowe.

**PIERWSZA POMOC** Difenakum jest antykoagulantem, który może być przyczyną krwotoków; mogą być one opóźnione w czasie nawet do kilku dni po narażeniu na działanie środka. Jeżeli nie występuje krwawienie, należy wykonać badanie NIR (czas protrombinowy) w czasie 48-72 godzin od narażenia na działanie preparatu. W przypadku wstrzymania krwawienia po kontakcie z antykoagulantem należy szukać porady w regionalnych ośrodkach toksykologicznych (<http://www.urpl.gov.pl/pb-osrodki-informacji-toxikologicznej>). W razie wypadku, podejrzenia narażenia na działanie antykoagulantu czy złego samopoczucia – zasięgnąć porady lekarza (w miarę możliwości pokaż etykietę produktu). W razie kontaktu preparatu ze skórą, zmyc dokładnie wodą z mydłem. Zdjąć i wyrzucić zanieczyszczoną odzież. W razie kontaktu o oczami, wyjąć szczerki/kontaktowe, jeżeli są, wolno i ostrożnie przemywać oko przez ok. 15-20 minut. Niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

W razie spożycia lub połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Wskazówka dla lekarza: Antidotum – Witamina K1 – pod kontrolą lekarza. Centrum Toksykologiczne: Kontaktować się z lekarzem lub uzyskać informacje lub zgłosić przypadek zatrucia: regionalne ośrodki toksykologiczne:

Warszawa tel. 22 619 66 54; Gdańsk tel. 58 682 04 04; Poznań tel. 61 847 69 46; Kraków tel. 12 411 99 99. W razie zatrucia zwierzęcia domowego niezwłocznie skontaktować się z weterynarzem.

Producent i podmiot odpowiedzialny: Killgerm Chemicals Limited, 115 Wakefield Road, Ossett, West Yorkshire, WF5 9AR, UK.

**Zawartość: 300g**

Seria etykiety 02/18

Nr serii i data produkcji: Patrz naklejka na tubie.

Killgerm Polska Sp. z o.o. ul. Sarabandy 61, 02-868 Warszawa.

t+48 (22) 8947400 f+48 (22) 894 74 07 e biuro@killgerm.com www.killgerm.com

**DO ZWALCZANIA MYSZY I SZCZURÓW**