Killgerm®
www.killgerm.com

Sakarat® D WAX BAIT

Zawiera 0,05g/kg (0,005%) difenakum

DO ZWALCZANIA MYSZY I SZCZURÓW

Sakarat D Wax Bait jest gotowym preparatem do zwalczania myszy i szczurów wewnątrz oraz wokół budynków. Do stosowania w odpornych na manipulację stacjach deratyzacyjnych lub punktach wykładania przynęty (w przypadku, gdy stacja deratyzacyjna nie może być zastosowana, przynętę należy umieścić tak, aby organizmy nie będące przedmiotem zwalczania nie mogły do niej dotrzeć). **WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PRZEZ PROFESJONALISTÓW.**

INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKA Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się i przestrzegać zaleceń zamieszczonych w materiałach informacyjnych dołączonych do produktu lub informacji przekazanych w punkcie sprzedaży. Przed użyciem przynęty należy przeprowadzić wstępne rozpoznanie terenu, na którym występują gryzonie, w celu właściwej identyfikacji gatunku gryzonia, miejsc aktywności oraz ustalenia prawdopodobnej przyczyny i stopnia infestacji gryzoni. Przed rozpoczęciem zabiegu należy usunąć inne potencjalne źródła pokarmu dla gryzoni (np. rozsypane ziarno, lub pozostałości żywności). Nie należy ingerować w środowisko bytowania gryzoni, gdyż może to mieć wpływ na zachowanie zwierząt i spożycie przynęty. NIE STOSOWAĆ PRODUKTU BEZPOŚREDNIO DO NOR GRYZONI. Stacje deratyzacyjne powinny być umieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów, w których zaobserwowano aktywność gryzoni (np. ścieżki, miejsca gniazdowania, miejsca karmienia zwierząt hodowlanych, otwory, nory itp.). Stacje deratyzacyjne należy wyraźnie oznakować tak, aby było oczywiste, że zawierają produkty gryzoniobójcze, i że nie wolno przy nich manipulować. **Oznakowania na stacjach deratyzacyjnych muszą zawierać następujące informacje:** „Nie przenosić ani nie otwierać"; „Zawiera substancję gryzoniobójczą"; „Nazwa produktu lub nr pozwolenia"; „Substancja(e) czynna(e)"; „W razie wypadku skontaktować się z ośrodkiem kontroli zatruć (należy podać numery telefonów do ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi)". Miejsca publiczne, w których stosowany jest produkt powinny być odpowiednio oznakowane. W pobliżu punktów wyłożenia przynęty powinna znajdować się informacja, że kontakt z produktem lub padłymi gryzoniami jest niebezpieczny dla zdrowia oraz informacja o zasadach udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrucia produktem. Tam, gdzie jest to możliwe zabezpieczyć przynętę w taki sposób, aby nie mogła być ona wynoszona. Stacje deratyzacyjne należy umieszczać w miejscach niedostępnych dla dzieci, ptaków, zwierząt domowych, zwierząt hodowlanych i zwierząt innych niż docelowe, z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt oraz z dala od przyborów kuchennych i powierzchni mających kontakt z produktem.

ZWROTY OKREŚLAJĄCE ZAGROŻENIE
Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.Może powodować uszkodzenie narządów <krew> poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. Stosować rękawice ochronne. W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego zakładu utylizacji odpadów. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

DAWKOWANIE PREPARATU
Myszy umieścić 2-5 cm (2-5g) preparatu w każdym punkcie, odstępy pomiędzy punktami 2-5 m.
Szczury umieścić 4-8 porcji o długości 15 cm i średnicy 1cm. 50-100g preparatu na punkt, odstępy pomiędzy punktami 5-10 m.
Do aplikacji wymagany jest pistolet dozujący (stosowany np. do tub z klejem lub uszczelniaczem). Przytrzymać tubę z preparatem i odciąć końcówkę plastikowej kopuły nad gwintem, ostrożnie by nie uszkodzić gwintu ani się nie skaleczyć. Następnie dołączyć (nakręcając) do tuby plastikową końcówkę dozującą. Umieścić w pistolecie dozującym i rozpocząć aplikację preparatu w odpowiednich miejscach, zgodnie z opisem powyżej. Dla ułatwienia dozowania odcinek 5 cm jest równy średnicy tuby w której znajduje się preparat. Podczas korzystania z pistoletu dozującego kończyć każdą pojedynczą aplikację preparatu poprzez zwolnienie spustu pistoletu dozującego, zarysowanie końcówką o stację, by zapobiec wyciekom preparatu, oraz nałożyć nakrętkę na nasadkę końcówki dozującej. Używać szpatułki do usuwania preparatu ze stacji podczas czyszczenia. Zakładać rękawice ochronne zarówno na czas procesu aplikacji jak i czyszczenia/usuwania rodentycydu z pistoletu czy szpatułki.

Regularnie kontrolować wyłożony preparat i zastępować go nowym w razie potrzeby (pobranie lub zanieczyszczenie rodentycydu). Działanie kontynuować do czasu ustania poboru preparatu, zazwyczaj po 1-3 tygodniach. Przez pierwsze dziesięć dni często kontrolować wyłożony preparat, następnie regularnie aż do czasu zaobserwowania braku ubytku rodentycydu. Wyszukiwanie i usuwanie ciał martwych gryzoni powinno odbywać się nie rzadziej niż inspekcje punktów kontrolnych. Stacje deratyzacyjne powinny zabezpieczać przynętę przed działaniem warunków atmosferycznych (deszczem, śniegiem itp.). Stacje umieszczać w miejscach zabezpieczonych przed zalaniem.Wymieniać każdą przynętę uszkodzoną przez wodę lub zanieczyszczoną. Po zakończeniu zabiegu deratyzacji usunąć pozostałości produktu.
Nosić odpowiednie rękawice ochronne. Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Po zastosowaniu produktu umyć ręce i skórę narażoną na bezpośredni z nim kontakt. W celu zmniejszenia styczności z produktu z rękami nakładać pastę przy pomocy szpatułki, nie dotykać zawartości opakowania rękami.
Jeżeli spożycie przynęty jest zbyt niskie w porównaniu do oszacowanego stopnia infestacji gryzoni, należy rozważyć przeniesienie stacji deratyzacyjnych w inne miejsce lub zmianę postaci użytkowej produktu. Nie stosować produktu dłużej niż 35 dni bez wcześniejszej oceny stopnia infestacji i skuteczności zwalczania gryzoni. Jeżeli po upływie 35 dni od rozpoczęcia zwalczania gryzoni przynęta jest w dalszym ciągu zjadana, a aktywność gryzoni nadal się utrzymuje, należy ustalić przyczynę braku skuteczności zabiegu. Jeżeli stwierdzono lub podejrzewa się zjawisko oporności na difenakum należy zastosować produkt zawierający inną substancję z grupy rodentycydów. Należy również rozważyć zastosowanie niechemicznych metod kontroli (np. pułapek).
O ile jest to możliwe, przed rozpoczęciem zwalczania gryzoni należy poinformować ewentualne osoby postronne (np. użytkowników obszaru zwalczania gryzoni i najbliższego otoczenia) o rozpoczęciu deratyzacji. Aby zmniejszyć ryzyko zatrucia wtórnego, należy często i regularnie wyszukiwać i usuwać padłe gryzonie przez cały okres deratyzacji.
W przypadku umieszczania stacji deratyzacyjnych w pobliżu wód powierzchniowych (np. rzek, stawów, cieków wodnych, wałów, rowów nawadniających) lub systemów drenujących należy dopilnować, aby przynęta nie miała kontaktu z wodą. Stosowanie niniejszego produktu w celach innych niż podane w etykiecie jest niezgodne z prawem.
Nr pozwolenia: PL/2014/0152/MR
PRZECHOWYWANIE Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w miejscu niedostępnym dla dzieci, ptaków, zwierząt domowych i hodowlanych. Przechowywać z dala do światła słonecznego. Długość przechowywania: do 2 lat od daty produkcji w temperaturze pokojowej. Unikać stosowania produktu w pobliżu rur z gorącą wodą, kotłowni i miejsc o temperaturze >30˚C. W celu ułatwienia aplikacji preparatu z tub, które były przechowywane w niskiej temperaturze (<10˚C), umieścić opakowania na ½ h w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej (zimą 10-18˚C, latem 15-20˚C).
Podczas ciepłych miesięcy przechowywać i transportować produkt w sposób zabezpieczający go przed działaniem wysokich temperatur. Produkt do użytku w letnich miesiącach oznaczony jest czerwoną naklejką z nr serii. Produkt do użytku w zimowych miesiącach oznaczony jest białą naklejką z nr serii.
W celu zapobieżenia przypadkowemu spożyciu przez człowieka Sakarat D Wax zawiera Bitrex™. **USUWANIE** Padłe gryzonie, opakowania po produkcie oraz pozostałości po zastosowaniu (w tym przynętę znalezioną poza stacją deratyzacyjną) zamknięte w oznakowanym pojemniku, usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych (np. spalarni). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych. Gryzonie mogą przenosić choroby. Padłe gryzonie i przynętę należy usuwać, stosując rękawice ochronne lub narzędzia, np. szczypce.
PIERWSZA POMOC Produkt zawiera substancję należącą do grupy antykoagulantów. W przypadku spożycia objawy mogą wystąpić z opóźnieniem i obejmują krwawienie z nosa i z dziąseł. W ciężkich przypadkach może dochodzić do powstawania siniaków oraz obecności krwi w kale i moczu.
ANTIDOTUM: Witamina K1 podawana wyłącznie przez personel medyczny/weterynaryjny. W przypadku: kontaktu ze skórą - spłukać skórę wodą, następnie umyć wodą z mydłem; kontaktu z oczami - przemyć oczy roztworem do przepłukiwania oczy lub wodą, utrzymując otwarte powieki przez co najmniej 10 minut; kontaktu z jamą ustną - ostrożnie przepłukać jamę ustną. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Nie wywoływać wymiotów, W przypadku połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej i pokazać opakowanie produktu lub etykietę.
W przypadku spożycia produktu przez zwierzę domowe należy skontaktować się z lekarzem weterynarii.

Producent i podmiot odpowiedzialny: Killgerm GmbH, Bussardweg 16, 41468 Neuss, Dusseldorf, Niemcy

Zawartość: 300g

Seria etykiety 07/19
Nr serii i data produkcji: Patrz naklejka na tubie.

Killgerm Polska Sp. z o.o. ul. Sarabandy 61, 02-868 Warszawa.
t +48 (22) 8947400 f +48 (22) 894 74 07 e biuro@killgerm.com www.killgerm.com

POLAND Sakarat D Wax Bait 300g Version2.indd 1 10/01/2022 09:36