



Prosty wyrok dla gryzoni

- + Skuteczność w odniesieniu do szczurów i myszy
- + Możliwość stosowania w trudno dostępnych miejscach
- + Skuteczny dodatek do przynęt



Racumin[®] Foam to gotowy do użycia rodentycyd w postaci piany, przeznaczony do zwalczania populacji szczurów i myszy. W miejscach, w których nie można zastosować tradycyjnych metod nęcenia (np. ubytki w ścianach), lub jeśli są one nieskuteczne (odrzuconie przynęty przez zwierzęta), piana **Racumin[®] Foam** może stanowić część programu zwalczania gryzoni oraz powinna być stosowana jako metoda alternatywna.

Powody używania piany Racumin[®] Foam

- **Piana Racumin[®] Foam** wykorzystuje nawyk gryzoni do pielęgnacji futra. W ciągu każdej doby 20% czasu spędzają na czyszczeniu futra i dlatego kontakt z preparatem **Racumin[®] Foam** gwarantuje przyjęcie śmiertelnej dawki.
- **Piana Racumin[®] Foam** jest idealnym rozwiązaniem, gdy problemem jest nieufność zwierząt wobec przynęty i/lub rywalizacja o żywność.
- **Piana Racumin[®] Foam** nie jest przynętą, a jej skuteczność nie opiera się na smaku
- Ślady przejścia zwierząt przez pianę są dobrym wizualnym wskaźnikiem aktywności gryzoni.

Kiedy korzystać z piany Racumin[®] Foam?

- Gdy metody związane z wykładaniem przynęty nie są skuteczne
- Gdy gryzonie okazują awersję do przynęty
- Gdy powracają problemy związane z neofobią (strachem przed nowym pożywieniem).

Gdzie korzystać z piany Racumin[®] Foam?

- Wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych (budynki rolnicze, handlowe, publiczne i przemysłowe, zakłady przemysłu spożywczego, domy)
- Na ścieżkach wyznaczonych przez szczury i myszy, w ukrytych przejściach i na śladach
 - Na poziomie wejść/otworów
 - Na poziomie otworów do rur wodociągowych, przepustów kabli elektrycznych itp. w ścianach i stropach
 - W pustych przestrzeniach między ścianami
 - W kanałach kablowych
- W miejscach, w których występuje wysoki poziom rywalizacji o żywność (nieatrakcyjność przynęty)
- Należy zachować minimalną odległość bezpieczeństwa, wynoszącą 2 metry pomiędzy miejscami aplikacji a miejscami przechowywania żywności.
- Produkt należy stosować w miejscach niedostępnych dla dzieci i zwierząt innych niż docelowe (zwierzęta domowe, dzikie).



SZCZUR WĘDROWNY
Rattus norvegicus



SZCZUR ŚNIADY
Rattus rattus



MYSZ DOMOWA
Mus musculus

Produkt nadaje się do każdego zastosowania

Skuteczne zwalczanie

Masz problem z gryzoniami?

TAK	NIE
Należy przygotować plan zwalczania z użyciem rodentycydu i tymczasowym nęceniem oraz zastosować środki sanitarne.	Należy kontynuować monitorowanie za pomocą nietoksycznych przynęt oraz wprowadzić środki higieny w celu ograniczenia ryzyka inwazji.

Inwazja ma miejsce w budynkach?

TAK		NIE	
Dostępne miejsca przejść		Wokół budynków	Na terenach otwartych
TAK	NIE		
Harmonix[®] Rodent Paste Racumin[®] Expert	Racumin[®] Foam	Harmonix[®] Rodent Paste Racumin[®] Expert	Harmonix[®] Rodent Paste Racumin[®] Expert

Czy akcja zwalczanie jest skuteczna?

TAK	NIE
Ponownie prowadzić monitorowanie.	Po upływie 35 dni: ponownie ocenić stan inwazji i skuteczność zwalczania, a następnie przedłużyć akcję do momentu zniknięcia problemu (w razie konieczności...)

Akcja deratyzacji z użyciem preparatu **Racumin[®] Foam**:

Dozwolone są 2 zabiegi rocznie. Jeden zabieg odpowiada 2 aplikacjom piany **Racumin[®] Foam**:

- Pierwsza aplikacja
- Druga aplikacja, która zwykle następuje 14 dni po pierwszej.

Okres 14 dni można skrócić w przypadku stwierdzenia intensywnego przechodzenia gryzoni.

Zabieg mający na celu wyeliminowanie inwazji gryzoni trwa zwykle 30 dni.

Racumin[®] Foam: dawkowanie w miejscu aplikacji

Gatunki docelowe	Dozwolona dawka maksymalna	Dawka zalecana w praktyce*	
		Ilość całkowita	Ilość / druga aplikacja
Szczury: <i>Rattus norvegicus</i> i <i>Rattus rattus</i>	20-30 g	Od 7 do 12 g	Od 2 do 4 g / drugie zastosowanie
Myszy: <i>Mus musculus</i>	4-30 g	Od 2 do 7 g	

* w zależności od średnicy otworu lub przejścia, bez całkowitego zasłaniania

Produkt stworzony z myślą o łatwości stosowania

Jak korzystać z piany Racumin® Foam?

Przed każdym użyciem należy się zapoznać z zaleceniami dotyczącymi prawidłowego stosowania produktu znajdującymi się w kartonowym opakowaniu.


Puszka zawiera 500 ml, co wystarcza na około 100 aplikacji, przy założeniu aplikacji trwającej 2 sekundy.



- 1 Energicznie potrząsać puszką do momentu usłyszenia kulki mieszającej.
- 2 Zamocować rurkę aplikatora.
- 3 Zdjąć nasadkę zabezpieczającą i przechować ją w bezpiecznym miejscu.
- 4 Nacisnąć przycisk, aby uwolnić pianę.
- 5 Nałożyć pianę na rozpoznane ścieżki, przejścia, wejścia/otwory, ścieżki zakryte i wnęki w ścianach (patrz tabela dawkowania).
- 6 Na ścieżkach gryzoni należy utworzyć przeszkodę z piany; zwierzęta będą musiały przez nią przejść, dzięki czemu ich ciała zostaną częściowo pokryte pianą.
- 7 Ważna informacja: Aby gryzonie mogły w dalszym ciągu korzystać z wejść, nie należy całkowicie blokować otworów pianą: otwory muszą pozostać dobrze widoczne. Należy się upewnić, że szkodnik nie będzie mógł ominąć przeszkody.
- 8 Po zakończeniu aplikacji piany **Racumin® Foam** należy założyć nakładkę zabezpieczającą na puszkę.
- 9 Nałożona piana utrzymuje się zwykle przez kilkanaście dni, w zależności od temperatury i wilgotności. Stopniowo ulega rozpadowi, aby ostatecznie zmienić się w proszek przyklejony do podłoża.



Masa, w zależności od ciśnienia i czasu naciskania na przycisk:



4 g



10 g



30 g

Zalecenia dotyczące stosowania

- W przypadku stosowania na wysokości należy trzymać pojemnik z aerozolem pionowo. Należy zapewnić, aby osadzona piana nie opadała.
- Nie nakładać na powierzchnie podatne na poplamienie; w razie potrzeby przetestować i zetrzeć nadmiar piany suchym ręcznikiem papierowym.
- Nie nakładać w pobliżu obszarów podatnych na wymywanie przez wodę lub zagrożonych powodzią.
- Przed rozpoczęciem nakładania z otwartej puszki należy się upewnić, że produkt jest w temperaturze pokojowej oraz energicznie potrząsać puszką do momentu usłyszenia kulki mieszającej.
- Nie nakładać w odległości mniejszej niż 2 m od jakiegokolwiek źródła żywności i powierzchni, na które są wykładane artykuły spożywcze (dowodzono, że odległość ta stanowi maksymalną granicę rozrzutu piany),
- Nie stosować w obszarach dostępnych dla dzieci, zwierząt domowych, zwierząt hodowlanych i dzikich.



Wpływ na gatunki inne niż docelowe

Racumin® Foam jest środkiem gryzoniobójczym; produkt ten należy stosować zgodnie z dobrymi praktykami i wskazówkami podanymi na etykiecie. W związku z tym należy zapewnić, aby zwierzęta inne niż docelowe nie mogły mieć kontaktu z pianą, również w miejscach niedostępnych. Ważne jest, aby przed zastosowaniem środka zidentyfikować przyczynę uciążliwości i upewnić się, że są to szczury lub myszy.

Psy i koty należy trzymać z daleka od obszaru poddanego działaniu środka, a wszelkie pozostałości muszą być czyszczone przy użyciu czystych jednorazowych ściereczek i ręczników papierowych, usuwanych następnie zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami prawa.

Racumin® Foam: po aplikacji

- Czas konieczny do pojawienia się efektów biobójczych wynosi od 4 do 6 dni
- Częstotliwość wizyt w obszarach stosowania środka powinna zostać oceniona przez użytkownika w zależności od poziomu początkowej populacji i częstotliwości przechodzenia przez pianę. Zasadniczo w pierwszym tygodniu konieczne są 1-2 wizyty, a następnie tę liczbę należy dostosować.
- W okresie zwalczania należy regularnie zbierać martwe zwierzęta w celu utrzymania właściwego poziomu higieny oraz uniknięcia żerowania na nich innych zwierząt.
- Zwłoki i puste opakowania należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Po zakończeniu zabiegów należy usunąć wszelkie ślady pozostałości piany.
- Czyszczenie rurki aplikatora: w razie potrzeby zawór i rurkę można oczyścić wodą



Karta identyfikacyjna Racumin® Foam

Kategoria użytkownika

Produkty przeznaczone do użytku przez użytkowników profesjonalnych przeszkolonych w zakresie zwalczania gryzoni. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego.



Opakowanie

500 ml



Pozwolenie na wprowadzenie do obrotu

Nr pozwolenia PL/2014/0139/MR z dnia 18.04.2014 r.

Typ produktu

TP14 Rodentycyd



Skład

0,4% wag. kumatetralylu

Formulacja

Generator aerozolu (AE)



Klasyfikacja

Aerозole palne (kategoria 1);
Toksyczność reprodukcyjna (kategoria 1B)
Działanie toksyczne na niektóre narządy docelowe – narażenie powtarzane (kategoria 2)
Podrażnienie oczu (kategoria 2)
Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego (kategoria 2)

W nagłym przypadku należy dzwonić pod numer 112 lub do centrum kontroli zatruć.

Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)

Ten produkt jest rodentycydem. Podobnie jak w przypadku każdego produktu biobójczego, użytkownik musi przestrzegać środków ostrożności związanych ze stosowaniem tych produktów podczas przygotowywania i stosowania produktu oraz czyszczenia urządzeń. Należy zakładać odpowiednie środki ochrony: rękawice, kombinezon i okulary ochronne.



RĘKAWICE

Należy zakładać rękawice ochronne (nitrylowe typu EN 374).



OKULARY OCHRONNE

Podczas obsługi produktu należy zakładać okulary ochronne (okulary certyfikowane zgodnie z normą EN 166:2002 - WE, numer 3)



KOMBINEZON

Kombinezon kategorii III. Typ 4. Zalecany, ale nieobowiązkowy.

envu™

envu



Aby uzyskać więcej informacji,
należy odwiedzić stronę
www.pl.envu.com

PRODUKTY DLA PROFESJONALISTÓW: PRODUKTY BIOBÓJCZE NALEŻY STOSOWAĆ Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.