

## XLURE MST DETEKTOR OWADÓW BIEGAJĄCYCH – SZKODNIKÓW MAGAZYNOWYCH

Dokument stworzony na podstawie Technical Data Sheet, autorstwa Russell IPM [www.russellipm.com](http://www.russellipm.com)

**Nazwa zwyczajowa** Pułapka feromonowa na wiele gatunków owadów

**Nazwa handlowa** Xlure-MST

**Kod produktu** CAT-MST-KIT/Refill

**Sposób działania** Feromon płciowy oraz atraktant spożywczy

**Przeznaczenie** Do monitorowania

**Opis** Wkład Xlure-MST zawiera specjalną mieszankę atraktantów spożywczych oraz feromonów owadów. Pułapka Xlure-MST może być stosowana do monitorowania obecności następujących owadów: Wołek zbożowy (*Sitophilus granarius*), Wołek ryżowy (*Sitophilus oryzae*), Wołek kukurydzowy (*Sitophilus zeamais*), Kapturek zbożowiec (*Rhyzopertha dominica*), *Ahasverus advena*, Spichrzak syryjski (*Oryzaephilus surinamensis*), Żywiak chlebowiec (*Stegobium paniceum*), *Oryzaephilus mercator*, Trojszyki (*Tribolium spp.*).

Substancja czynna: 4,8-Dimethyldecanal, 14-methyl-Z-8-hexadecenal, 7-Hydroxy-4, 6-dimethylnonan-3-one oraz atraktant spożywczy (kiełki pszenicy i lotny karob)

Substancje obojętne: Filtr UV, przeciwutleniacz


### Przechowywanie:

Zamrażarka (temp. -18°C) ponad 24 mies.

Chłodziarka (temp. 0-4°C) do 24 mies.

Lodówka (temp. 4-10°C) do 12 mies.

Chłodny pokój (temp. 10-20°C) do 6 mies.



**Trwałość:** 6 - 8 tygodni

### Obsługa:

Obchodzić się ostrożnie z pułapką i wkładem, unikać długotrwałego kontaktu ze skórą.

### Sposób stosowania:

Zerwać aluminiową folię i umieścić wkład wewnątrz pułapki. Umieścić pułapkę na podłodze w potencjalnym miejscu występowania owadów.

Kontrolować pułapkę 2-3 razy w tygodniu. W razie zapelnienia pułapki wymienić wkład.

### Rozmieszczenie

W każdym pomieszczeniu, w którym chcemy monitorować obecność owadów lub w odstępach 8-10 metrów jedna od drugiej.

### Zapisy z pułapek:

Zbierać dane raz w tygodniu. W razie dużej infestacji może być to wymagane częściej.

### Analiza zapisów z pułapek:

Decyzja o użyciu pestycydów nie powinna być podjęta wyłącznie na podstawie obecności owadów w pułapce. Należy mieć na uwadze bezpieczeństwo przechowywanych produktów.

### Wymiana:

Wymieniać wkład co 6-8 tygodni lub gdy jest to zalecane przez profesjonalnego technika firmy ddd.

Wymieniony wkład usunąć poza teren objęty monitoringiem.



**Dystrybucja w Polsce:** Killgerm Polska sp. z o.o. ul. Sarabandy 61, 02-868 Warszawa,  
tel. +48 22 894 74 00

[biuro@killgerm.com](mailto:biuro@killgerm.com)

[www.killgerm.pl](http://www.killgerm.pl)